

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO ACTIVADOR METABÓLICO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN	% P/V
BASES ORGÁNICAS	20,00
CALCIO (CaO)	8,00
NITRÓGENO (N)	6,00
POTASIO (K2O)	5,00
MAGNESIO (MgO)	3,00
BORO (B)	0,25

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
DENSIDAD A 20° C	1370g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	VERDE
SOLUBILIDAD A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

BORMACKAL®SL, es un activador del metabolismo a base de hidratos de carbono, calcio, potasio, magnesio y boro.

BORMACKAL®SL, por su contenido de calcio, actúa en la firmeza de la pulpa (calcio estructural) y en la eficiencia metabólica (calcio funcional).

Se recomienda el uso de **BORMACKAL®SL**, previo y durante el período de flor.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	300 - 400	2 - 6	A partir de brotes de 20 cm, repetir cada 7 días. Prepinta, repetir a los 7 días.
POMÁCEAS	300 - 400	2 - 6	A partir de puntas verdes, repetir cada 7 días . A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días.
CAROZOS	300 - 400	2 - 6	A partir de puntas verdes, repetir cada 7 días . A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días.
CÍTRICOS Y PALTOS	300 - 400	2 - 6	A partir de inicio de flash vegetativo de primavera, repetir cada 7 días.
BERRIES	300 - 400	2 - 6	A partir de botón floral, repetir cada 7 días.
KIWIS	300 - 400	2 - 6	A partir de brotes de 20 cm, repetir cada 7 días. 50 y 40 días pre cosecha.
NOGAL	300 - 400	2 - 6	A partir de botón floral, repetir cada 7 días.
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	300	3 - 6	A partir de 10 días del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 7 días..
CEREALES	300	3 - 6	A partir de 10 días post emergencia.
LEGUMINOSAS	300	3 - 6	A partir de 10 días post emergencia.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con fosfatos.

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.