

BIOESTIMULANTE EN BASE A CARBOXILATO DE COBRE

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

| COMPOSICIÓN     | % P/V |
|-----------------|-------|
| BASES ORGÁNICAS | 20,00 |
| COBRE (Cu)      | 5,00  |
| NITRÓGENO (N)   | 2,00  |

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Zn 1500

| CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS |              |
|---------------------------------|--------------|
| DENSIDAD A 20° C                | 1270 g/L     |
| PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%     | 4            |
| COLOR                           | AZUL INTENSO |
| SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C      | 100%         |

Fabricado por NVA Spa.  
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile  
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

**CitoCur® SL**, es un bioestimulante foliar líquido a base de cobre complejo (carboxilato de cobre) soluble. **CitoCur® SL**, es un activador del metabolismo de la planta. Corrector de deficiencias de cobre. La acción de **CitoCur® SL**, se potencia y complementa en mezcla con Algaxil y Polifait 36-33. Dosis recomendada: 100cc **CitoCur®SL** + 150cc Algaxil + 150cc Polifait 36-33, por 100 litros de agua.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

| FRUTALES          | cc / 100lt | Nº DE TRATAMIENTOS | OBSERVACIONES                                                                                                     |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIDES             | 100        | 3 - 4              | 20 centímetros de longitud de brote. Ruptura de caliptra. Cuaja. Pre pinta                                        |
| POMÁCEAS          | 100        | 3 - 4              | Pre flor. Plena flor. Fruto cuajado. Inicio quiebre de color                                                      |
| CAROSOS           | 100        | 3 - 4              | Pre flor. Plena flor. Fruto cuajado. Inicio quiebre de color                                                      |
| CÍTRICOS Y PALTOS | 100        | 3 - 4              | Pre floración, flash vegetativo primavera y otoño, repeticiones a los 20-30 días.                                 |
| BERRIES           | 100        | 3 - 4              | A partir de absorción foliar, repetición a los 15 días. Inicio de pinta, repetir a los 15 días.                   |
| KIWIS             | 100        | 3 - 4              | Brotes de 20 centímetros de longitud, repetición a los 15 días. Inicio maduración de frutos                       |
| NOGAL             | 100        | 2                  | Flor no receptiva, repetir en flor receptiva                                                                      |
| AVELLANO EUROPEO  | 100        | 2 - 3              | A partir de absorción foliar, repeticiones cada 15-20 días                                                        |
| CULTIVOS          | cc / 100lt | Nº DE TRATAMIENTOS | OBSERVACIONES                                                                                                     |
| HORTALIZAS*       | 100        | 4 - 5              | En almacigos y desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo, repetir cada 15 días. |
| CEREALES          | 100        | 4 - 5              | A partir de 15 días después de la emergencia, repeticiones cada 10-15 días                                        |
| LEGUMINOSAS       | 100        | 2                  | A partir de 15 días después de la emergencia, repetir a los 10 días.                                              |

Hortalizas\*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, melón, pimentón, zapallo, camote, pepino, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.