

CARBOXILATO DE MAGNESIO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

Cito-Mg®SL, es un fertilizante líquido a base de ácidos carboxílicos y magnesio. El aporte de Cito-Mg®SL, debe ser realizado a partir del inicio del periodo vegetativo hasta la pinta o inicio de la madurez.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cm. Repetir cada 7 días. Inicio de pinta.
POMÁCEAS	200 - 300	4 - 5	Desde fruto recién cuajado. Repetir cada 7 días. Inicio de quiebre de color.
CAROZOS	200 - 300	4 - 5	Desde fruto recién cuajado. Repetir cada 7 días. Inicio de quiebre de color.
CÍTRICOS Y PALTOS	200 - 300	4 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 10 días.
BERRIES	200 - 300	4 - 5	Desde fruto cuajado. Repetir cada 10 días.
KIWIS	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cm. - Repetir cada 7 días. 45 días antes de cosecha.
NOGAL	200 - 300	4 - 5	A partir de brotación. Repetir cada 7 días.
AVELLANO EUROPEO	200 - 300	4 - 5	A partir de brotación. Repetir cada 7 días.

CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	250	4 - 5	Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 7 días.
CEREALES	250	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.
LEGUMINOSAS	250	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, pimiento, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre las horas de viento y temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con fosfato de amonio. Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

COMPOSICIÓN

% P/V

MAGNESIO (MgO)

8,00

BASES ORGÁNICAS

3,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 60 Cr VI 2 Hg 1 Ni 100 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1210 G/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%

6

COLOR

AMARILLO VERDOSO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

100%

Fabricado por NVA Spa.
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :