

SILICATO DE POTASIO AGRÍCOLA

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

SILICIO (SiO ₂)	28,00
POTASIO (K ₂ O)	15,00
BASES ORGÁNICAS	5,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1310 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	12
COLOR	NEGRO
SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

CitoSil® SL, es un fertilizante foliar líquido a base de Silicatos y Humatos de Potasio. Aumenta la eficiencia en el proceso de fotosíntesis y disminuye la pérdida de agua por evapo- transpiración. **CitoSil® SL**, favorece los mecanismos que aumentan la tolerancia de las plantas al estrés medioambiental (sequía, temperaturas extremas, etc.)

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Ablandamiento de grano - pinta.
POMÁCEAS	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Quiebre de color.
CITRICOS	300	Las que sean necesarias	En cualquier etapa fenológica, especialmente al inicio del quiebre de color
CEREZOS	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Fruto pajizo, quiebre de color.
ARÁNDANOS	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Inicio de pinta de los primeros frutos
NOGALES	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Inicio del proceso de llenado.
AVELLANO EUROPEO	300	Las que sean necesarias	A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. Inicio del proceso de llenado.
HORTALIZAS*	300	Las que sean necesarias	A partir de emergencia, pre y post trasplante, según sea el caso. Repeticiones cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Producto de reacción alcalina, incompatible con correctores de reacción ácida (zinc, cobre, hierro, magnesio, manganeso, calcio, etc.)

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.