

CARBOXILATO DE ZINC

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

BASES ORGÁNICAS

16,0

ZINC (ZN)

8,0

CONTAMINANTES (ppm), Cd 60 Cr VI 2 Hg 1 Ni 100 Pb 120 As 40 Cu 600

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1120 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%

4

COLOR

AMARILLO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Cito-Zn® SL, es un fertilizante líquido a base de Zinc y ácidos carboxílicos. Corrige deficiencias de zinc
Cito-Zn® SL, debe ser aportado al inicio del período vegetativo y en la etapa de post cosecha.
Cito-Zn® SL, es un cofactor de enzimas relacionadas con el proceso de diferenciación de yemas.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cm. Repetir cada 7 días. Poscosecha.
POMÁCEAS	200 - 300	4 - 5	Desde puntas verdes, repetir cada 5-7 días. Poscosecha.
CAROZOS	200 - 300	4 - 5	Desde botón verde, repetir cada 5-7 días. Poscosecha
CÍTRICOS Y PALTOS	200 - 300	4 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 10 días. Poscosecha.
BERRIES	200 - 300	4 - 5	Desde yema floral inchada en adelante, repetir cada 5-7 días. Poscosecha.
KIWIS	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cms. Repetir cada 7 días. Poscosecha.
NOGAL	200 - 300	4 - 5	Apartir de inicio de brotación, repetir cada 7 días. Poscosecha.
AVELLANO EUROPEO	200 - 300	4 - 5	Apartir de inicio de brotación, repetir cada 7 días. Poscosecha.
CULTIVOS	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	200 - 300	4 - 5	Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación según cultivo. Repetir cada 7 días.
CEREALES	200 - 300	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.
LEGUMINOSAS	200 - 300	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre las horas de viento y temperaturas extremas

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.