

CARBOXILATO DE ZINC - MANGANESO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

FERTILIZANTE

COMPOSICIÓN

% P/V

BASES ORGÁNICAS	14,00
Cinc (Zn)	7,00
Manganeso (Mn)	2,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1150 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	ÁMBAR
SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Cito-ZnMn® SL, es un fertilizante foliar líquido a base de Zinc, Manganeso y ácidos carboxílicos. El zinc es un cofactor de enzimas relacionadas con el proceso de diferenciación de yemas. El Manganeso es un activador enzimático, importante en la síntesis de caroteno, xantofilas y ácido ascórbico y participa en el metabolismo del nitrógeno.

Cito-ZnMn® SL, debe ser aportado al inicio del período vegetativo. Corrija deficiencia de Zinc.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	200-300	4 - 5	A partir de brotes 20 cm. Repetir cada 7 días
POMÁCEAS	200-300	4 - 5	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 5-7 días.
CAROSOS	200-300	4 - 5	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 5-7 días.
CITRICOS Y PALTOS	200-300	4 - 5	A partir de inicio de actividad vegetativa, pre flor. Repetir cada 10 días.
BERRIES	200-300	4 - 5	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 5-7 días.
KIWIS	200-300	4 - 5	A partir de brotes 20 cms. Repetir cada 7 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS	200	□ - □	Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 7 días.
CEREALES	200	□ - □	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.
LEGUMINOSAS	200	□ - □	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.