

FERTISTRESS® SL



BIOESTIMULANTE FOLIAR PARA CONDICIONES DE ESTRÉS ABIÓTICO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

BIOESTIMULANTE

COMPOSICIÓN	% P/V
EXTRACTO DE ALGA <i>Durvillaea antarctica</i>	10,00
EXTRACTO VEGETAL DE CACTUS	10,00
AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL	5,50
GLICINA BETAÍNA	4,00
ANTIOXIDANTES	2,00

CONTAMINANTES (ppm): Cd 1,5 ; Cr VI 2 ; Hg 1; Ni 50 ; Pb 120 ; As 40 ; Cu 600 ; Zn 1500
Escherichia coli: Ausente Salmonella spp.: Ausente

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1035g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	ÂMBAR OLIVÂCEO
SOLUBILIDAD A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.
Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile
Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

FERTISTRESS® es un bioestimulante no microbiano líquido desarrollado para mejorar la tolerancia y la capacidad de recuperación de los cultivos frente a condiciones de estrés fisiológico en etapas críticas del desarrollo, tales como déficit hídrico, estrés térmico y otros. Su formulación combina extractos vegetales bioactivos, osmoprotectores, aminoácidos funcionales, antioxidantes y vitaminas, contribuyendo al equilibrio fisiológico y a la estabilidad productiva del cultivo bajo condiciones adversas.

FRUTALES	DOSIS	N° DE TRATAMIENTOS	MOMENTOS RECOMENDADOS DE APLICACIÓN
PALTO	1 - 1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Floración y cuaja; inicio del desarrollo del fruto; crecimiento activo de fruta en primavera-verano; verano temprano y periodos de alta radiación; postcosecha y preparación de la temporada siguiente.
CEREZO	0,8 - 1 L/ ha por aplicación	1 - 3	Cuaja/crecimiento del fruto; inicio de maduración a precosecha; postcosecha.
UVA DE MESA	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Prefloración/cuaja; inicio de maduración a precosecha; prevención de estrés en cualquier momento.
ARÁNDANO	1 - 1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Floración/cuaja; brotación/desarrollo vegetativo; llenado y maduración; postcosecha.
NOGAL	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Cuaja y crecimiento inicial del fruto; inicio de llenado de nuez; postcosecha temprana; aplicación adicional ante eventos de estrés abiótico.
AVELLANO EUROPEO	1,2 L/ ha por aplicación	1 - 3	Inicio de actividad vegetativa y última etapa de diferenciación floral; fecundación; periodos de alta temperatura o demanda evaporativa; desarrollo y llenado de fruto; aplicación adicional ante eventos de estrés abiótico.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar bien el envase antes de usar. Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Aplicar 0,8 - 1,2 L/ha por aplicación, en un volumen de agua que permita una cobertura adecuada y homogénea del follaje, preferentemente entre 200 y 500 Lt de agua/ha.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.