

Foliafeed Ca NEW® SL

(1 - 0 - 0 - 20CaO - 0,25 B)



FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE CALCIO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

FOLIAFEED CA NEW® SL, es una formulación concentrada líquida sobre la base de calcio complejoado con aminoácidos y boro orgánico.

El Calcio contenido en **FOLIAFEED CA NEW® SL**, es un activador del metabolismo de la planta

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	300 - 400	4	A partir de brotes con 20 cms. de longitud, repetir cada 7 días. A partir de fruto cuajado, una o dos aplicación para estructura celular del raquis.
POMÁCEAS	300 - 400	7	Desde puntas verdes, repetir cada 5-7 días
CAROZOS	300 - 400	4	Desde puntas verdes, repetir cada 5-7 días
CÍTRICOS Y PALTOS	300 - 400	4	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 10 días.
BERRIES	300 - 400	6	Desde 15 días previo a floración, repetir cada 7 días.
KIWIS	300 - 400	3	A partir de brotes con 20 cms de longitud, repetir cada 7 días
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	300 - 400	4 - 6	A partir de 10 días del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 7 días.

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1310 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	ÁMBAR
SOLUBILIDAD	100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos

DURACIÓN

3 meses a temperatura de refrigeración (4° C) y 1 mes a temperatura ambiente (25°C).

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.