

FERTILIZANTE LÍQUIDO A BASE DE IODO SOLUBLE - ACTIVADOR METABÓLICO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

FOSFORO (P₂O₅) 2,00

IODO (I) 2,00

POTASIO (K₂O) 1,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C 1080 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% 4

COLOR MARRÓN

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C 100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl - www.nva.cl

CONTENIDO :

Activador fisiológico de doble acción, incrementa cantidad, calidad y condición de frutos y mejora el balance de energía de la planta.

El ingrediente activo Iodo libre, se encuentra estabilizado y está formulado especialmente para el uso agrícola.

Activa y eficiente el proceso de fotosíntesis, aumentando la formación de azúcares y de otros fotosintatos (energía).

Al aumentar la disponibilidad de energía, favorece todos los procesos que la planta acomete.

Cataliza la actividad enzimática necesaria para la formación de clorofila.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días. Prepinta, repetir a los 7 días.
POMÁCEAS	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días.
CAROSOS	250 - 300	2 - 6	A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días
CÍTRICOS Y PALTOS	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días
BERRIES	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días
KIWIS	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días.
NOGAL	250 - 300	2 - 6	13 días previos a las etapa de llenado final de fruto, repetir a los 7 días.
AVELLANO EUROPEO	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	250 - 300	3 - 5	A partir de 10 días del tranplante, emergencia o brotación, según cultivo, repetir cada 7 días.
CEREALES	250 - 300	3 - 5	A partir de 20 días post emergencia.
LEGUMINOSAS	250 - 300	3 - 6	A partir de 10 días post emergencia.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel y ojos.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con medios alcali- nos o ligeramnete ácidos, por lo que se requiere utilizar siempre a pH inferior a 6.