

Macrobrotación® SL

(15-0-0 + 5CaO-1MgO-0,2Zn-0,01B)



FERTILIZANTE LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE N,CA, MG, ZN Y B

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

MACROBROTACIÓN® SL, es un fertilizante líquido soluble a base de nitrógeno y calcio, especialmente diseñado para ser aplicado durante la época de receso en árboles frutales, viñas y berries.

- Estimula la brotación uniforme.
- Estimula y nutre el desarrollo de brotes.
- Aumenta eficiencia fotosintética de las prime- ras hojas del brote.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	Lt / Ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de brotación. Abundante mojado dirigido a brotes y cargadores - pitones.
POMÁCEAS	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.
CAROSOS	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.
BERRIES	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a toda la planta
KIWIS	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de brotación. Abundante mojado dirigido a brotes y cargadores - pitones.
NOGAL	35-40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.

COMPOSICIÓN

% P/V

NITRÓGENO (N)	15,00
CALCIO (Ca)	5,00
MAGNESIO (MgO)	1,00
ZINC (Zn)	0,20

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1200 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	5
COLOR	INCOLORO
SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

DURACIÓN

3 meses a temperatura de refrigeración (4° C) y 1 mes a temperatura ambiente (25° C).

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agro- químicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

CONTENIDO :