

Macropotasio® SL

(0 - 0 - 14)



FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE A BASE DE POTASIO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

POTASIO (K₂O) 14,00

BASES ORGANICAS 10,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C 1170 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% 7

COLOR MARRÓN

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C 100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

MACROPOTASIO® SL, es una formulación líquida para uso foliar, basada en polioles específicos, carbohidratos relacionados y otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas por las plantas Favorece y participa en la maduración de los fe- noles, en especial los relacionados con el color.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	300-400	2 - 3	Desde 30 días antes de pinta, repetir a los 15 días. Realizar una tercera aplicación en fruta de color a inicio de pinta.
POMÁCEAS	300-400	3 a 4	Desde fruto 2,5 cm. hasta 20 días antes de la cosecha.
CAROZOS	300-400	3	Desde fruto 2,5 cm. hasta 20 días antes de la cosecha.
CÍTRICOS Y PALTOS	300-400	3	Con brotes en activo crecimiento de primavera. Repetir c/ 10 días.
BERRIES	300-400	3 a 4	Desde frutos cuajados, repetir cada 7 días
KIWIS	300-400	3	60 - 45 y 30 días antes de cosecha

CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	300-400	3 - 6	Hortalizas de hoja o tallo, desde 20 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días. Hortalizas de fruto, a partir de la cuja de los primeros frutos. Repetir cada 7-10 días. Tubérculos y raíces, a partir de 40 días previos a la cosecha, repetir a los 10 y 20 días

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.