

BIOESTIMULANTE RADICULAR LÍQUIDO SOLUBLE

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

MACROSOIL® SL, es una formulación líquida para aplicación al suelo, basada en aminoácidos, sustancias húmicas solubles, ácidos carboxílicos, carbohidratos, ácidos poliurónicos, polioles específicos y otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas por las plantas.

Eficiente bioestimulante radical, incentiva brotación y crecimiento de raíces.

Estimula y nutre microorganismos del suelo.

Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de la rizósfera.

Aumenta la eficiencia en la nutrición, efecto quelante.

A través de la multiplicación y activación de microorganismos del suelo, aumenta capacidad de intercambio catiónico (CIC).

COMPOSICIÓN

% P/V

AMINOÁCIDOS, SUSTANCIAS HÚMICAS,
CARBOHIDRATOS, CARBOXÍLICOS, POLIOLES

26,00

NITRÓGENO (N)

2,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1120 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%

6

COLOR

MARRÓN

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

100%

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES

OBSERVACIONES

VIDES

POMÁCEAS

CAROZOS

CÍTRICOS Y PALTOS

BERRIES

AVELLANO EUROPEO

NOGAL

KIWIS

En tratamientos de recuperación de plantas con déficit radicular:

Determinar claramente las causas por las cuales se llegó al problema y corregirlos, luego aportar MACROSOIL® SL, a razón de 10 - 15 litros por hectárea, a partir de raíces activas, repetir tratamiento a los 7 y 14 días. Inyección en la penúltima hora de riego.

En tratamientos de mantención:

A partir de raíces activas, aportar **MACROSOIL® SL**, a razón de 15 litros por hectárea, repetir aplicación a los 7 días. Inyección en la penúltima hora de riego.

En hortalizas y leguminosas con riego tecnificado:

A partir de 10 días del trasplante, 10 días post emergencia o 10 días de inicio de brotación, según sea el cultivo, inyectar MACROSOIL® SL, a razón de 10 litros por hectárea, repetir tratamiento a los 7 y 14 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Inyección en el último tercio del riego, respetando el tiempo de vaciado de matrices y mangueras

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :