

Polifaith® 40-20 SL

(0 - 40 - 20)



FOSFITO POTÁSICO ÁCIDO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

FÓSFORO (P_2O_5)

40

POTASIO (K_2O)

20

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1400 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%

3

COLOR

INCOLORO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

POLIFAITH® 40-20 SL, es un fertilizante con alto contenido de fósforo y potasio en la forma de fosfito potásico.

POLIFAITH® 40-20 SL, se caracteriza por sumovilidad en sentido acrópeto y basípeto. Por su modo de acción es capaz de recorrer todo el sistema vascular de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	Lt / ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
POMÁCEAS	4 a 5	2 - 5	Desde caída de pétalos y cada 15 días. Post cosecha temprana.
CAROSOS	4 a 5	2 - 5	Desde fruto cuajado. Repetir a los 15 días. Post cosecha temprana.
CÍTRICOS Y PALTOS	4 a 5	2 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 15 - 30 días.
BERRIES	4 a 5	2 - 5	Después de la floración, repetir cada 15 días. Post cosecha temprana.
KIWIS	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
AVELLANO EUROPEO	4 a 5	2 - 5	A partir de brotación, intervalos de 15 días.
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	250 a 400	2 - 5	Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

NOTA IMPORTANTE

Asegurarse de que no hallan residuos de fungicidas de cobre en el cultivo para prevenir la disolución de estos, los que pueden producir fitotoxidad.

COMPATIBILIDAD

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad. No mezclar con agroquímicos de contacto.