

FERTILIZANTE DE POTASIO ALCALINO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

POTASIO (K₂O) 12

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C 1140 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% 9

COLOR INCOLORO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C 100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Super K SL, es una formulación líquida en base de potasio más agentes de absorción y traslocación.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	450 - 750	6 - 7	A partir de brotes de 20 cm, cada 7 días.
POMÁCEAS	450 - 750	6 - 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
CAROSOS	450 - 750	6 - 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
CÍTRICOS Y PALTOS	450 - 750	6 - 7	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir a los 7 días.
BERRIES	450 - 750	6 - 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
KIWI	450 - 750	6 - 7	A partir de brotes de 20 cm, cada 7 días.
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	450 - 750	6 - 7	Cuando sea necesario, cada 7 días.
CEREALES	450 - 750	6 - 7	
LEGUMINOSAS	450 - 750	6 - 7	

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.