



Cito-Zn® SL

(0 - 0 - 0 - 8Zn)

CARBOXILATO DE ZINC

INFORMACIÓN GENERAL

Cito-Zn® SL, es un fertilizante líquido a base de Zinc y ácidos carboxílicos para su quelación, confiriéndole características únicas de absorción y transporte de este elemento en el sistema vascular de las plantas.

El zinc es un importante componente y activador de enzimas y su principal función está en la síntesis del triptofano, aminoácido precursor de la auxina Ácido Indolacético (AII), responsable del crecimiento de brotes, hojas, frutos y raíces.

El zinc es un cofactor de enzimas relacionadas con el proceso de diferenciación de yemas.

El zinc es un elemento de poca movilidad en las plantas, pero gracias a la calidad del quelato en el **Cito-Zn® SL**, este elemento es totalmente absorbido y aprovechado por las plantas.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Zinc (Zn)	8
Bases Orgánicas	16

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1120 g/l
pH	4
Color	Amarillo
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cm. Repetir cada 7 días. Poscosecha.
Pomáceas	200 - 300	4 - 5	Desde puntas verdes, repetir cada 5-7 días. Poscosecha.
Carozos	200 - 300	4 - 5	Desde botón verde, repetir cada 5-7 días. Poscosecha
Cítricos y Paltos	200 - 300	4 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 10 días. Poscosecha.
Berries	200 - 300	4 - 5	Desde yema floral inchada en adelante, repetir cada 5-7 días. Poscosecha.
Kiwis	200 - 300	4 - 5	A partir de brotes 20 cms. Repetir cada 7 días. Poscosecha
Nogal	200 - 300	4 - 5	Apartir de inicio de brotación, repetir cada 7 días. Poscosecha
Avellano Europeo	200 - 300	4 - 5	Apartir de inicio de brotación, repetir cada 7 días. Poscosecha
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	200 - 300	4 - 5	Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotació según cultivo. Repetir cada 7 días.
Cereales	200 - 300	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.
Leguminosas	200 - 300	4 - 5	A partir de 15 días post emergencia. Repetir a los 10 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.