

INFORMACIÓN GENERAL

CitoSil® SL, es un fertilizante líquido a base de Silicatos y Humatos de Potasio, especialmente formulado para el fortalecimiento de las plantas.

Aumenta la eficiencia en el proceso de fotosíntesis, disminuye la pérdida de agua por evapotranspiración.

Al estar íntimamente relacionado con el calcio, colabora en mantener la fortaleza e integridad de las paredes celulares de hoja, tallos y frutos, mejorando la condición de post cosecha.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Potasio (K ₂ O)	15
Silicio (SiO ₂)	28
Bases orgánicas	5

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Níquel (Ni) 0,5.

CitoSil® SL, favorece los mecanismos que aumentan la tolerancia de las plantas al estrés medioambiental (sequía, temperaturas extremas, etc.)

CitoSil® SL, favorece el proceso de traslocación de azúcares, aumentando el contenido de los grados brix en los frutos.

Favorece la toma de color y calibre.

Mejora la relación pulpa-cáscara en frutos de semilla.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1310 g/l
pH	12
Color	Negro
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Producto de reacción alcalina, incompatible con correctores de reacción ácida (zinc, cobre, hierro, magnesio, manganeso, calcio, etc.)

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Ablandamiento de grano - pinta.
Pomáceas	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Quiebre de color.
Cítricos	300	Las que sean necesarias	• En cualquier etapa fenológica, especialmente al inicio del quiebre de color
Cerezos	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Fruto pajizo, quiebre de color.
Arándanos	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Inicio de pinta de los primeros frutos.
Nogales	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Inicio del proceso de llenado.
Avellano Europeo	300	Las que sean necesarias	• A partir de inicio de brotación, repeticiones cada 7 días. • Inicio del proceso de llenado.
Hortalizas*	300	Las que sean necesarias	• A partir de emergencia, pre y post trasplante, según sea el caso. • Repeticiones cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.