

INFORMACIÓN GENERAL

Foliafeed B[®] SL, es un fertilizante líquido a base de boro y etanolamina. Por su alta pureza y solubilidad es utilizado vía foliar, permitiendo su segura aplicación en cualquier estado fenológico de la planta. La calidad de la formulación permite su uso en dosis bastante menores que las de las sales inorgánicas, anulando el riesgo de toxicidad y permitiendo la mezcla con reguladores de crecimiento, bioestimulantes y fitosanitarios.

El boro, contenido en **Foliafeed B[®] SL**, participa en:

- Absorción y metabolismo de los cationes, en especial del calcio.
- Formación de pectinas de las paredes celulares.

- Síntesis de ácidos nucleicos y carbohidratos (energía)
- Transporte de carbohidratos en el floema.
- Actividad meristemática y radicular.
- La estructuración y desarrollo del tubo polínico, estigma, estilo y ovario.
- Permeabilidad de las membranas.
- Metabolismo de las proteínas.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Boro (B)	9
Bases Orgánicas	12,0

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1210 g/l
pH	8
Color	Ámbar
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	200 - 300	3 - 4	• Prefloración para favorecer polinización y cuaja. Pinta. • Post cosecha temprana con hojas activas.
Pomáceas	200 - 300	3 - 4	• Desde botón floral hasta inicio de floración. Quiebre de color.
Carozos	200 - 300	3 - 4	• En post-cosecha temprana, con hojas activas.
Cítricos y Paltos	200 - 300	3 - 4	• Desde 20 días antes de floración hasta inicio de floración. Quiebre de color.
Berries	200 - 300	3 - 4	• Desde botón floral hasta inicio de floración. Pinta • En post cosecha temprana con hojas activas.
Kiwis	200 - 300	3 - 4	• Prefloración para favorecer polinización y cuaja. Inicio maduración. • Post cosecha temprana con hojas activas.
Nogal	200 - 300	3 - 4	• Inicio de brotación. Inicio del proceso de llenado y poscosecha.
Avellano Europeo	200 - 300	3 - 4	• Inicio de Brotación. Inicio del proceso de llenado y poscosecha.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	200	1 - 3	A partir de 10 días del transplante, emergencia o brotación, según cultivo, repetir cada 7 días.
Cereales Leguminosas	200	1 - 2	Desde 15 días post emergencia, repetir cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.