

INFORMACIÓN GENERAL

Foliafeed Ca NEW[®] SL, es una formulación concentrada líquida sobre la base de calcio complejoado con aminoácidos y boro orgánico.

El Calcio contenido en **Foliafeed Ca NEW[®] SL**, es un activador del metabolismo de la planta, participe indispensable en la formación de paredes celulares mejorando la calidad y consistencia de los tejidos

y por ende la vida de post cosecha de frutos, flores, tallos y hojas.

Este elemento, en conjunción con la calmodulina, juega un rol funcional como regulador de la permeabilidad de la membrana celular y de las actividades enzimáticas.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno (N)	1
Calcio (CaO)	20
Boro (B)	0,25
Orgánicos	7

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1310 g/l
pH	5
Color	Ámbar
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	300 - 400	4 1	• A partir de brotes con 20 cms. de longitud, repetir cada 7 días. • A partir de fruto cuajado, una o dos aplicación para estructura celular del raquis.
Pomáceas	300 - 400	7	• Desde puntas verdes, repetir cada 5-7 días.
Carozos	300 - 400	4	
Cítricos y Paltos	300 - 400	4	• Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 10 días.
Berries	300 - 400	6	• Desde 15 días previo a floración, repetir cada 7 días.
Kiwis	300 - 400	3	• A partir de brotes con 20 cms de longitud, repetir cada 7 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	300	4 - 6	• A partir de 10 días del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.