



IODOS NVA® SL

(0 - 2 - 1 + 2I)

FERTILIZANTE LÍQUIDO A BASE DE IODO SOLUBLE - ACTIVADOR METABÓLICO

INFORMACIÓN GENERAL

Activador fisiológico de doble acción, incrementa cantidad, calidad y condición de frutos y mejora el balance de energía de la planta.

El ingrediente activo Iodo libre, se encuentra estabilizado y está formulado especialmente para el uso agrícola.

Activa y eficiente el proceso de fotosíntesis, aumentando la formación de azúcares y de otros fotosintatos (energía).

Al aumentar la disponibilidad de energía, favorece todos los procesos que la planta acomete.

Cataliza la actividad enzimática necesaria para la formación de clorofila.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Fosforo (P ₂ O ₅)	2
Potasio (K ₂ O)	1
Iodo (I)	2

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Níquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1080 g/l
pH	4
Color	Marrón
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

El producto es incompatible con medios alcalinos o ligeramnete ácidos, por lo que se requiere utilizar siempre a pH inferior a 6.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicación foliar.
- Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel y ojos.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días. Prepinta, repetir a los 7 días.
Pomáceas	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días. A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días.
Carozos	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días. A partir de 15 días antes del quiebre de color, repetir a los 7 días.
Cítricos y Paltos	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días.
Berries	250 - 300	2 - 6	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días.
Kiwis	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días. 15 días previos a las etapa de llenado final de fruto, repetir a los 7 días.
Nogal	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días.
Avellano Europeo	250 - 300	2 - 6	A partir de brote 30-40 cm., repetir cada 10 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	250 - 300	3 - 5	A partir de 10 días del tranplante, emergencia o brotación, según cultivo, repetir cada 7 días.
Cereales	250 - 300	3 - 5	A partir de 20 días post emergencia.
Leguminosas	250 - 300	3 - 5	A partir de 20 días post emergencia.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.