



Macrobrotación[®] SL

(15-0-0 + 5CaO-1MgO-0,2Zn-0,01B)

FERTILIZANTE LÍQUIDO SOLUBLE A BASE DE N,Ca, Mg, Zn Y B

INFORMACIÓN GENERAL

MACROBROTACIÓN[®] SL, es un fertilizante líquido soluble a base de nitrógeno y calcio, especialmente diseñado para ser aplicado durante la época de receso en árboles frutales, viñas y berries.

- Mejora el proceso de diferenciación floral (cofactor enzimático).
- Estimula la brotación uniforme.
- Estimula y nutre el desarrollo de brotes.
- Aumenta eficiencia fotosintética de las primeras hojas del brote.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno (N)	15
Calcio (Ca)	5
Magnesio (Mg)	1
Zinc (Zn)	0,2
Boro (B)	0,01

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1200g/l
pH	5
Color	Incoloro
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes, sin embargo atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	Lt / Ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de brotación. Abundante mojado dirigido a brazos y cargadores - pitones.
Pomáceas	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.
Carozos	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.
Berries	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a toda la planta.
Kiwis	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de brotación. Abundante mojado dirigido a brazos y cargadores - pitones.
Nogales	35 - 40	1	Aplicar 10-20 días antes de la fecha de floración. Abundante mojado dirigido a ramas, centros frutales y ramillas.