



Macropotasio® SL

(0 - 0 - 14)

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE A BASE DE POTASIO

INFORMACIÓN GENERAL

El potasio, catalizador de procesos, desempeña un papel esencial en la economía del agua al regular la apertura y cierre de los estomas. El potasio es un elemento activador de enzimas, participa en el transporte de carbohidratos y la síntesis de proteínas.

MACROPOTASIO® SL, es una formulación líquida para uso foliar, basada en polioles específicos, carbohidratos relacionados y otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas por las plantas.

Ventajas y formas de acción de MACROPOTASIO® SL:

- Estimula la síntesis y transporte de carbohidratos en la planta.

- El Potasio contenido en **MACROPOTASIO® SL**, favorece la movilización de nutrientes, mejorando tanto el proceso de llenado, maduración y calibre del fruto, como la calidad y consistencia de éste.
- En post-cosecha mejora el flujo de carbohidratos hacia órganos de almacenamiento (reservas de la planta).
- Aumenta la resistencia de las plantas sometidas a estrés hídrico.
- Favorece la uniformidad de la cosecha.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Potasio	14
Polioles, Ácidos Húmicos, Carboxílicos y Carbohidratos	10

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Níquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1170 g/l
pH	7
Color	Marrón
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	300 - 400	2 -3	• Desde 30 días antes de pinta, repetir a los 15 días. • Realizar una tercera aplicación en fruta de color a inicio de pinta.
Pomáceas	300 - 400	3 a 4	• Desde fruto 2,5 cm. hasta 20 días antes de la cosecha.
Carozos	300 - 400	3	• Desde endurecimiento del carozo a quiebre de color.
Cítricos y Paltos	300 - 400	3	• Con brotes en activo crecimiento de primavera. Repetir c/ 10 días.
Berries	300 - 400	3 a 4	• Desde frutos cuajados, repetir cada 7 días.
Kiwis	300 - 400	3	• 60 - 45 y 30 días antes de cosecha.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas	300 - 400	3 a 6	• Hortalizas de hoja o tallo, desde 20 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días. • Hortalizas de fruto, a partir de la cuaja de los primeros frutos. Repetir cada 7-10 días. • Tubérculos y raíces, a partir de 40 días previos a la cosecha, repetir a los 10 y 20 días

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.