



Polifaith® 36-33 SL

(0 - 36 - 33)

FOSFITO POTÁSICO NEUTRO

INFORMACIÓN GENERAL

POLIFAITH® 36-33 SL, es un fertilizante con alto contenido de fósforo y potasio en la forma de fosfito potásico.

POLIFAITH® 36-33SL, estimula el sistema hormonal de la planta.

POLIFAITH® 36-33 SL, se caracteriza por su movilidad en sentido acrópeto y basípeto. Por su modo de acción es capaz de recorrer todo el sistema vascular de la planta.

POLIFAITH® 36-33 SL, es un eficiente desobturador vascular,

suministra potasio a la planta y es un activador metabólico en estados post estrés.

En tratamientos de huertos decaídos, mezclar 100 cc de **Cito-Cur® SL**, por 100 lt de agua, más 210 a 270 cc de **POLIFAITH® 36-33 SL**, por 100 lt de agua.

POLIFAITH® 36-33 SL, ha sido diseñado especialmente para uso foliar (pH neutro).

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/P)
Fósforo (P ₂ O ₅)	36
Potasio (K ₂ O)	33
Bases Orgánicas	0,1

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Níquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1390 g/l
pH	7
Color	Incoloro
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad. No mezclar con agroquímicos de contacto.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	Lt / ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
Pomáceas	4 a 5	2 - 5	Desde caída de pétalos y cada 15 días. Post cosecha temprana.
Carozos	4 a 5	2 - 5	Desde fruto cuajado. Repetir a los 15 días. Post cosecha temprana.
Cítricos y Paltos	4 a 5	2 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 15 - 30 días.
Berries	4 a 5	2 - 5	Después de la floración, repetir cada 15 días. Post cosecha temprana.
Kiwis	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
Avellano Europeo	4 a 5	2 - 5	A partir de brotación, intervalos de 15 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	250 a 400	2 - 5	• Desde 15 días después del trasplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.