



BIOESTIMULANTE A BASE DE ALGAS MARINAS, ÁCIDOS HÚMICOS, AMINOÁCIDOS, HIDRATOS DE CARBONO Y VITAMINAS

INFORMACIÓN GENERAL

PROLIOL® SL, es un fertilizante líquido a base de extracto de alga (*Durvillaea antarctica*), enriquecido con nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos carboxílicos, ácidos húmicos, aminoácidos, micronutrientes y vitaminas, formando un complejo órgano-mineral de fácil y rápida asimilación.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno (N)	3
Fósforo (P2O5)	2
Potasio (K2O)	3
Aminoácidos	3,2
Ácidos húmicos	5
Hidratos de carbono	10
Ácidos Carboxílicos	10
Magnesio (MgO)	0,15
Azufre (S)	0,15
Fierro (Fe)	0,02
Zinc (Zn)	0,02
Manganeso (Mn)	0,02
Boro (B)	0,001
Cobre (Cu)	0,002
Molibdeno (Mo)	0,0001
Cobalto (Co)	0,0001
Fitohormonas naturales	10 ppm
Vitaminas	trazas

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

PROLIOL® SL, es un poderoso bioestimulante capaz de mejorar los umbrales de estrés y de revitalizar las plantas en su recuperación post estrés, permitiendo acceder a altos potenciales productivos.

PROLIOL® SL, ha sido especialmente diseñado para mejorar la condición de la planta durante el período de división celular, lográndose considerables incrementos en calibre final y peso de frutos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1120 g/l
pH	5
Color	Marrón
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Por tratarse de un producto natural, es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes de uso común, sin embargo, en caso de duda, es recomendable hacer una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	120 - 200	3 - 4	Durante todo el período vegetativo, especialmente en período de división celular del futuro fruto. Como prevención de situaciones de estrés.
Pomáceas	120 - 200	3 - 4	
Carozos	120 - 200	3 - 4	
Cítricos y Paltos	120 - 200	3 - 4	
Berries	120 - 200	3 - 4	
Kiwis	120 - 200	3 - 4	
Nogal	120 - 200	3 - 4	
Avellano Europeo	120 - 200	3 - 4	
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas	120 - 200	3 - 4	En almácigos, post trasplante ó post emergencia, repetir cada 7-10 días.
Cereales	120 - 200	3 - 4	A partir de emergencia, cada 7-14 días.
Leguminosas	120 - 200	3 - 4	

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.