



HIDROGENCARBONATO DE POTASIO FOLIAR

INFORMACIÓN GENERAL

Super K SL, es una formulación líquida en base a hidrogencarbonato de potasio más agentes de absorción y traslocación.

El potasio contenido en **Super K SL**, estimula la producción de hormonas.

El potasio contenido en Super K SL:

- Estimula la síntesis y el transporte de carbohidratos en la planta.
- Favorece la movilización de nutrientes, mejorando tanto el proceso de llenado, maduración, color y calibre del fruto, como la calidad y consistencia de este.

•	Favorece	la	uniforr	midad	de	la	cosecha	
	1 8 1 1 1 1 1 1 1 1	161	unnun	muau	uc	161	COSECHIA.	

- En post cosecha, mejora el flujo de carbohidratos hacia órganos de almacenamiento.
- Regula la apertura estomática, disminuyendo el efecto del estrés hídrico.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)			
Potasio (K ₂ O)	12			
Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5;				

Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS					
	Densidad mínima a 20°C	1140 g/l			
	рН	9			
	Color	Incoloro			
	Solubilidad a 20°C	100%			

Compatibilidad:

Atendiendo el mecanismo de acción recomendamos no mezclar con otros foliares.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	450 - 750	6 a 7	A partir de brotes de 20 cm, cada 7 días.
Pomáceas	450 - 750	6 a 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
Carozos	450 - 750	6 a 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
Cítricos y Paltos	450 - 750	6 a 7	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir a los 7 días.
Berries	450 - 750	6 a 7	A partir de primeras hojas, cada 7 días.
Kiwis	450 - 750	6 a 7	A partir de brotes de 20 cm, cada 7 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	450 - 750	6 a 7	
Cereales	450 - 750	6 a 7	Cuando sea necesario, cada 7 días.
Leguminosas	450 - 750	6 a 7	

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.